

Indicatorenset DSAA

Uitvraag ziekenhuizen/ZBC's over verslagjaar 2023

Versie 2023.1, juni 2022

Meer informatie op:

- www.transparantieportaal.nl
- www.dica.nl
- www.zorginzicht.nl

Samengesteld door:

Organisaties van cliënten:

- PFN

Organisaties van zorgaanbieders of zorgverleners:

- NVvV

Organisaties van zorgverzekeraars of Wlz-uitvoerders:

- ZN

Overig:

-

Aanspreekpunt:

DICA

indicatoren@dica.nl

Deze indicatorset is na toetsing opgenomen in het Register van Zorginstituut Nederland. Verplichte en eventuele vrijwillige indicatoren worden aangeleverd via het door de partijen gekozen aanleverportaal (gegevensmakelaar). Die faciliteert de route (aanlevering en publicatie) voor verplichte transparantie. De verplicht aangeleverde gegevens worden door Zorginstituut Nederland gepubliceerd.

Inhoud

1	Overzicht indicatoren	3
2	Algemene informatie	4
2.1	Uitgangspunten	4
2.2	Populatiebepaling	4
2.3	Aanlevering van de gegevens	4
2.4	Indicatorenwerkgroep	5
3	Vast te leggen gegevens	6
4	Indicatoren	7
5	Wijzigingstabel	16
6	Bijlage: toelichting op informatie per indicator	17

1 Overzicht indicatoren

Indicator-nummer	Indicatornaam	Bron¹	Transparantie?²
1	Volume AAA operatie segment C	DSAA	Verplicht
2	Volume aorta aneurysma en dissectie operaties	DSAA	Verplicht
3	Mortaliteit	DSAA	Verplicht
4	Textbook Outcome	DSAA	Verplicht

¹ Vul hier de bron van de indicator in (bijvoorbeeld kwaliteitsregistratie X, EPD, ZIS, etc.)

² Vrijwillige indicatoren worden niet opgenomen op de Transparantiekalender en dus niet aangeleverd aan en gepubliceerd door Zorginstituut Nederland. Vrijwillige indicatoren worden gedeeld met de Zorgverzekeraars, Patiëntenorganisaties en Zorgaanbieders

2 Algemene informatie

2.1 Uitgangspunten

De indicatoren zijn gebaseerd op de DSAA kwaliteitsregistratie.
Aanlevering op ziekenhuisniveau/ZBC.

- Doel van deze indicatorset is (meerkeuze):
 - o interne sturing (waaronder leren & verbeteren)
 - o verkrijgen van transparantie over verleende zorg (waaronder samen beslissen)
 - o het afleggen van externe verantwoording

- Gepubliceerde transparante gegevens uit de openbare database zijn bedoeld voor (meerkeuze):
 - o Cliënten
 - o Zorgaanbieders en zorgverleners
 - o Zorgverzekeraars
 - o Wlz-uitvoerders en andere financiers
 - o Toezichthouders, waaronder de IGJ en NZa
 - o Onderzoekers

De indicatoren zijn gebaseerd op:

- o Professionele standaard, namelijk: Normeringsdocument chirurgische behandeling, versie 8.1. van NVVH
- o Kwaliteitsstandaard, namelijk:
- o (Internationale) Indicatorenset, namelijk:
- o Afspraken over gegevensuitwisseling, namelijk:

2.2 Populatiebepaling

Voor alle indicatoren in deze indicatorenset bestaat de populatie uit:

Inclusie:

- Alle patiënten bij wie een vaatchirurgische/endovasculaire behandeling wordt gestart voor een aneurysma of dissectie van de abdominale en/of thoracale aorta of arteria iliaca. Hierbij worden alle electieve patiënten, patiënten met een acuut symptomatisch en patiënten met een geruptureerd aneurysma of dissectie van de aorta meegenomen.
- Alle patiënten bij wie een operatieve behandeling is gestart maar niet afgemaakt wordt wegens het overlijden van de patiënt.
- Alle patiënten waarbij een revisie van een eerder aangelegde aorta prothese plaatsvindt.

Exclusie:

- Conservatieve behandeling middels surveillance. Wanneer er na surveillance toch over wordt gegaan tot operatieve behandeling, komt de patiënt wel in aanmerking.

2.3 Aanlevering van de gegevens

Via www.zorginzicht.nl is het processchema te raadplegen voor de aanlevering van de gegevens behorende bij de indicatoren.

2.4 Indicatorenwerkgroep

De werkgroep voor het onderhoud van de indicatorset DSAA bestond in 2022 uit de volgende personen:

Vanuit DSAA waren de volgende personen in de indicatorenwerkgroep vertegenwoordigd:

Mw. dr. E.S. van Hattum (voorzitter)

Drs. G.P. Akkersdijk

Drs. J.W. Elshof

Mw. Drs. A. Alberga

2.5 Externe partijen

Tevens waren de volgende personen aanwezig bij de ontwikkeldagen:

Mw. M. van der Waals – NVZ

Dhr. T. Jonkergouw – PFN

Mw. C. Gernette – Stichting Overgewicht

Mw. E. de Goeij – FMS

Mw. J. Gehlen – CZ

Mw. K. Janssen – ZINL

Mw. A. Lenssen – CZ

Mw. B. van Leiden – ZN

Mw. L. Vunderink – ZN

De volgende personen waren aanwezig bij de indicatoredagen:

Mw. I. van Beusekom – ZINL

Mw. E. Oud – FMS

Mw. D. Sprengers – PFN

Dhr. M. van Bree – ZN

3 Vast te leggen gegevens

Om als zorgaanbieder deze indicatorset te kunnen aanleveren, moeten per cliënt de volgende gegevens (variabelen) worden vastgelegd:³

De informatie over de vast te leggen gegevens voor deze indicatorenset zijn te vinden in de datadictionary van de DSAA op <https://support.mrdm.nl/registraties/dsaa/>

³ Als alle zorgaanbieders dezelfde (kwaliteits)registratie gebruiken kun je dit hoofdstuk leeg laten. Als er echter verschillen zijn in registratie of verwerker van gegevens is dit overzicht noodzakelijk om kwaliteit van de gegevens te borgen.

4 Indicatoren

Indicatornaam	Volume AAA operatie segment C
Indicatornummer	1
Operationalisatie	Aantal patiënten met een intact aneurysma aortae abdominalis in aortasegment C waarbij primair electief geïntervenieerd is.
Informatie voor cliënten	Inzicht of het ziekenhuis de norm per jaar behaalt.
Relevantie en toepasbaarheid	NVvH norm
Type indicator	Structuur
Achtergrond van de indicator	Document: Normeringsdocument chirurgische behandeling, versie 8.1. van NVvH Initiator: DSAA
Doel van het meten en publiceren	Monitoren van het aantal aorta aneurysma interventies ten behoeve van de kwaliteit van de chirurgische behandeling.
Transparantie	Verplicht
Rekenregels en definities	
Datatype	Aantal
Teller	Aantal patiënten met een intact aneurysma aortae abdominalis in aortasegment C waarbij primair electief geïntervenieerd is*.
Vraag	n.v.t.
Antwoordopties	Aantal; één antwoord mogelijk
Definitie	*Het betreft hier de open of endovasculaire exclusie van het aneurysma aortae abdominalis waarbij voor de operatieve procedure de aortaklem onder de mesenterica superior heeft gestaan of een endoprothese is geplaatst met ten hoogste fenestraties voor de nierarteriën.
Aggregatieniveau	Locatieniveau
In-/exclusiecriteria	Inclusie: <ul style="list-style-type: none"> • Alle patiënten bij wie een vaatchirurgische/endovasculaire behandeling wordt gestart voor een aneurysma of dissectie van de abdominale aorta of arteria iliaca. Hierbij worden alle primair electieve patiënten meegenomen. • Alle patiënten bij wie een operatieve behandeling is gestart maar niet afgemaakt wordt wegens het overlijden van de patiënt. Exclusie: <ul style="list-style-type: none"> • Alle patiënten waarbij een revisie van een eerder aangelegde aorta prothese plaatsvindt. • Conservatieve behandeling middels surveillance. Wanneer er na surveillance toch over wordt gegaan tot operatieve behandeling, komt de patiënt wel in aanmerking.
Rekenregels en casemixcorrecties	Rekenregel: zie teller/noemer Casemixcorrectie: n.v.t.
Databron (registratie)	DSAA
Norm	NVvH norm:

	In de zorginstelling (ziekenhuislocatie) worden tenminste 20 aorta aneurysma interventies in aorta segment C per jaar, per locatie verricht, indien de zorginstelling alleen aorta interventies in segment C verricht
Meetperiode	01-01-2023 t/m 31-12-2023
Aanleverfrequentie	Eén keer per jaar
Eerste aanleverdatum	2014

Indicator naam	Volume aorta aneurysma en dissectie operaties
Indicator nummer	2
Operationalisatie	Aantal patiënten met een aneurysma aortae of dissectie waarbij operatief geïnterveneerd is.
Informatie voor cliënten	Inzicht of het ziekenhuis de norm per jaar behaalt.
Relevantie en toepasbaarheid	NVvH norm
Type indicator	Structuur
Achtergrond van de indicator	Document: Normeringsdocument chirurgische behandeling, versie 8.1. van NVvH Initiator: DSAA
Doel van het meten en publiceren	Monitoren van het aantal aorta aneurysma interventies ten behoeve van de kwaliteit van de chirurgische behandeling.
Transparantie	Verplicht
Rekenregels en definities	
Datatype	Aantal
Teller A	Aantal patiënten met een aneurysma aortae of dissectie waarbij operatief geïnterveneerd is*.
Teller B	Aantal patiënten met een aneurysma aortae of dissectie in segment A waarbij operatief geïnterveneerd is**.
Teller C	Aantal patiënten met een aneurysma aortae of dissectie in segment B waarbij operatief geïnterveneerd is***.
Teller D	Aantal patiënten met een aneurysma aortae of dissectie in segment C waarbij operatief geïnterveneerd is****.
Teller E	Aantal patiënten met een aneurysma aortae of dissectie in segment B/C of A/B/C waarbij operatief geïnterveneerd is.
Vraag	n.v.t.
Antwoordopties	Aantal; één antwoord mogelijk
Definitie	*Het betreft hier alle operatieve of endovasculaire exclusies van het aneurysma aortae of dissectie van de aorta. **Segment A: aorta ascendens tot aan de arteria subclavia links. ***Segment B: aorta descendens vanaf de arteria subclavia links tot aan de arteria mesenterica superior. ****Segment C: abdominale aorta distaal van de arteria mesenterica superior.
Aggregatieniveau	Locatieniveau
In-/exclusiecriteria	Inclusie: <ul style="list-style-type: none"> • Alle patiënten bij wie een vaatchirurgische/endovasculaire behandeling wordt gestart voor een aneurysma of dissectie van de abdominale en/of thoracale aorta of arteria iliaca. Hierbij worden alle electieve patiënten (intact), patiënten met een acuut symptomatisch (intact) en patiënten met een geruptureerd aneurysma (niet-intact) of dissectie van de aorta meegenomen. • Alle patiënten bij wie een operatieve behandeling is gestart maar niet afgemaakt wordt wegens het overlijden van de patiënt.

	<ul style="list-style-type: none"> Alle patiënten waarbij een revisie van een eerder aangelegde aorta prothese plaatsvindt. <p>Exclusie:</p> <ul style="list-style-type: none"> Conservatieve behandeling middels surveillance. Wanneer er na surveillance toch over wordt gegaan tot operatieve behandeling, komt de patiënt wel in aanmerking.
Rekenregels en casemixcorrecties	<p>Rekenregel: zie teller/noemer</p> <p>Casemix correctie: n.v.t.</p>
Databron (registratie)	DSAA
Norm	<p>NVvH norm:</p> <p>Electieve behandeling:</p> <p>In de zorginstelling (ziekenhuislocatie) worden tenminste 20 aorta aneurysma interventies in aorta segment C per jaar, per locatie verricht, indien de zorginstelling alleen aorta interventies in segment C verricht;</p> <p>OF</p> <p>- In de zorginstelling (ziekenhuislocatie) worden tenminste 40 aorta aneurysma interventies, waarvan minimaal 10 TEVAR in aorta segment B en/of C per jaar, per locatie verricht, indien de zorginstelling ook aorta interventies in segment B verricht;</p> <p>OF</p> <p>- In de zorginstelling (ziekenhuislocatie) worden tenminste 60 aorta aneurysma interventies, waarvan minimaal 10 TEVAR , in aorta segment A en/of B en/of C per jaar, per locatie verricht indien de zorginstelling ook aorta interventies in segment A verricht.</p> <p>Behandeling geruptureerd aneurysma:</p> <p>- Indien de zorginstelling naast de electieve- ook de geruptureerde aorta abdominalis aneurysma's interventies verricht, geldt een norm van 40 per jaar, per locatie.</p> <p>De volumenorm betreft alle aorta gerelateerde ingrepen wegens dilaterend vaatlijden aan de aorta (boog, descendens, suprarenaal en infrarenaal), acuut en electief, EVAR en OSR.</p> <p>NB. Norm wordt in 2022 herzien.</p>
Meetperiode	01-01-2023 t/m 31-12-2023
Aanleverfrequentie	Eén keer per jaar
Eerste aanleverdatum	2018

Indicator naam	Mortaliteit
Indicator nummer	3
Operationalisatie	Percentage patiënten dat een primaire operatie/interventie ondergaat vanwege een aneurysma aortae abdominalis in aortasegment C, dat overlijdt binnen 30 dagen na de operatie/interventie of in dezelfde ziekenhuisopname.
Informatie voor cliënten	Inzicht in de sterfte na de operatie.
Relevantie en toepasbaarheid	Middels deze indicator wordt het percentage mortaliteit per ziekenhuis inzichtelijk gemaakt.
Type indicator	Uitkomst
Achtergrond van de indicator	Document: nvt Initiator: DSAA
Doel van het meten en publiceren	Monitoren van de mortaliteit van patiënten na behandeling.
Transparantie	Verplicht
Rekenregels en definities	
Datatype	Percentage
Teller A	Aantal patiënten dat een primaire operatie/interventie* ondergaat vanwege een niet-intact*** geruptureerd aneurysma aortae abdominalis in aortasegment C, dat overlijdt binnen 30 dagen of in dezelfde ziekenhuisopname.
Teller B	Aantal patiënten dat een primaire operatie/interventie* ondergaat vanwege een intact** aneurysma aortae abdominalis in aortasegment C, dat overlijdt binnen 30 dagen of in dezelfde ziekenhuisopname.
Noemer A	Aantal patiënten dat een primaire operatie/interventie* ondergaat vanwege een geruptureerd (niet-intact***) aneurysma aortae abdominalis in aortasegment C.
Noemer B	Aantal patiënten dat een primaire operatie/interventie* ondergaat vanwege een intact** aneurysma aortae abdominalis in aortasegment C.
Vraag	n.v.t.
Antwoordopties	Percentage; één antwoord mogelijk
Definitie	*Operatie/interventie: zowel de open als endovasculaire behandeling van het aneurysma. ** Intact: electief of acuut symptomatisch ***Niet-intact: geruptureerd aneurysma
Aggregatieniveau	Locatieniveau
In-/exclusiecriteria	Inclusie: <ul style="list-style-type: none"> • Alle patiënten bij wie een vaatchirurgische/endovasculaire behandeling wordt gestart voor een aneurysma of dissectie van de abdominale aorta of arteria iliaca. Hierbij worden alle patiënten met een intact aneurysma en patiënten met een geruptureerd aneurysma of dissectie van de aorta meegenomen. • Alle patiënten bij wie een operatieve behandeling is gestart maar niet afgemaakt wordt wegens het overlijden van de patiënt. Exclusie:

	<ul style="list-style-type: none"> • Alle patiënten waarbij een revisie van een eerder aangelegde aorta prothese plaatsvindt. • Conservatieve behandeling middels surveillance. Wanneer er na surveillance toch over wordt gegaan tot operatieve behandeling, komt de patiënt wel in aanmerking.
Rekenregels en casemixcorrecties	Rekenregels: zie teller/noemer Geen casemix correctie toegepast
Databron (registratie)	DSAA
Meetperiode	01-01-2021 t/m 31-12-2023 (berekend over 3 jaren)
Aanleverfrequentie	Eén keer per jaar
Eerste aanleverdatum	Deels in 2017, volledig in 2019

Indicator naam	Textbook Outcome
Indicator nummer	4
Operationalisatie	Percentage patiënten dat een primair electieve operatie/interventie ondergaat vanwege een intact aneurysma aortae abdominalis (segment C), waarbij sprake is van een Textbook Outcome.
Informatie voor cliënten	Inzicht in het percentage Textbook Outcome
Relevantie en toepasbaarheid	Middels deze indicator wordt het percentage Textbook Outcome per ziekenhuis inzichtelijk gemaakt. Textbook Outcome is een samengestelde indicator en beschrijft het percentage patiënten dat geen ongewenste uitkomst tijdens de perioperatieve periode heeft behaald.
Type indicator	Uitkomst
Achtergrond van de indicator	Document: nvt Karthaus, Eleonora G. MD*,†; Lijftogt, Niki MD*,†; Busweiler, Linde A. D. MD*,†; Elsmann, Bernard H. P. MD, PhD‡; Wouters, Michel W. J. M. MD, PhD†,§; Vahl, Anco C. MD, PhD¶; Hamming, Jaap F. MD, PhD* In collaboration with the Dutch Society of Vascular Surgery, the Steering Committee of the Dutch Surgical Aneurysm Audit, the Dutch Institute for Clinical Auditing Textbook Outcome, Annals of Surgery: November 2017 - Volume 266 - Issue 5 - p 898-904 doi: 10.1097/SLA.0000000000002388 Initiator: DSAA
Doel van het meten en publiceren	Inzichtelijk maken van kwaliteit van zorg rondom aorta aneurysma interventies.
Transparantie	Verplicht
Rekenregels en definities	
Datatype	Percentage
Teller	Aantal patiënten dat een primaire electieve operatie/interventie* ondergaat vanwege een intact aneurysma aortae abdominalis in aortasegment C waarbij sprake is van een textbook outcome**.
Noemer	Aantal patiënten dat een primair electieve operatie/interventie* ondergaat vanwege een intact aneurysma aortae abdominalis in aortasegment C.
Vraag	n.v.t.
Antwoordopties	Percentage
Definitie	*Operatie/interventie: zowel de open als endovasculaire behandeling van het aneurysma. **Textbook outcome: patiënten waarbij sprake is van geen postoperatieve mortaliteit tijdens opname of t/m 30 dagen na de operatie/interventie, geen intra-operatieve complicatie, geen chirurgische postoperatieve complicatie, geen re-interventie, geen heropname binnen 30 dagen na ontslag en geen verlengde opnameduur (evar >4 dagen, open chirurgie >10 dagen).
Aggregatieniveau	Locatieniveau
In-/exclusiecriteria	Inclusie: <ul style="list-style-type: none"> Alle patiënten bij wie een vaatchirurgische/endovasculaire behandeling wordt gestart voor een aneurysma of dissectie van de abdominale aorta of arteria iliaca. Hierbij worden alle primair electieve patiënten meegenomen.

	<ul style="list-style-type: none"> • Alle patiënten bij wie een operatieve behandeling is gestart maar niet afgemaakt wordt wegens het overlijden van de patiënt. <p>Exclusie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Patiënten met een niet-intact (geruptureerd) aneurysma • Alle patiënten waarbij een revisie van een eerder aangelegde aorta prothese plaatsvindt. • Conservatieve behandeling middels surveillance. Wanneer er na surveillance toch over wordt gegaan tot operatieve behandeling, komt de patiënt wel in aanmerking.
Rekenregels en casemixcorrecties	Rekenregel: zie teller/noemer Geen casemix correctie toegepast
Databron (registratie)	DSAA
Meetperiode	01-01-2021 t/m 31-12-2023 (berekend over 3 jaren)
Aanleverfrequentie	Eén keer per jaar
Eerste aanleverdatum	2022

5 Wijzigingstabel

Wijzigingstabel ten opzichte van de gids van verslagjaar 2022

Indicator (nummer oud, nummer nieuw, INID)	Wijziging
3	Deelindicatoren electieve operatie en acuut symptomatisch aneurysma aortae abdominalis (voorheen teller/noemer A en B) zijn samengevoegd tot intact aneurysma's
4,5 en 6	Worden vervangen door textbook outcome
7 wordt 4	Nummering schuift op

6 Bijlage: toelichting op informatie per indicator

Operationalisatie	De indicator in één korte zin omschreven. Let op: vermeld duidelijk de eenheid van de indicator in deze zin. Bijvoorbeeld: 'wachtijd in dagen'.
Informatie voor cliënten	Het belang van en de betekenis van de indicator wordt hier kort zonder vaktermen verwoord. Een indicator is een meetbaar onderdeel van de zorg wat iets kan zeggen over de kwaliteit van zorg. In de informatie van cliënten wordt beknopt omschreven wat de indicator betekent en hoe deze geïnterpreteerd moet worden ('lager is beter', 'een instelling moet onder de norm van X scoren').
Relevantie en toepasbaarheid	Geef aan waarom de indicator relevant is en voor wie.
Type indicator	<ul style="list-style-type: none"> - Uitkomst - Proces - Structuur
Achtergrond van de indicator	Op basis waarvan is de indicator opgesteld? Verwijs naar een richtlijn/standaard, of een internationale indicatorset waarin de indicator ook is opgenomen. Dit vergroot de validiteit van de indicator: zegt deze indicator echt iets over kwaliteit van zorg?
Doel van het meten en publiceren	Beschrijf wat beoogd wordt met het meten en publiceren. Geef aan voor welke fase in het zorgproces de indicator relevant is; eventueel voor welke type zorginstelling. Geef ook aan – waar van toepassing – in welke situatie de indicator niet langer relevant is.
Transparantie	<ul style="list-style-type: none"> - verplicht (publicatie in Openbare Database van Zorginstituut Nederland) - vrijwillig (geen openbare publicatie. Doorlevering alleen naar patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars en zorgaanbieders)
Rekenregels en definities	
Datatype	Het datatype dat moet worden aangeleverd: <ul style="list-style-type: none"> - tekst (vrije tekst of een keuze uit een lijst in de indicatorgids) - ja/nee - aantal (een geheel getal) - getal - percentage (een getal tussen 0 en 100. Teller/noemer *100)
Teller(s)	Het getal boven de streep van een breuk. De teller is altijd een deelverzameling van de noemer. Om lange formuleringen te vermijden, is de volledige omschrijving van de deelverzameling niet altijd herhaald in de teller.
Noemer	Het getal onder de streep van een breuk. Nauwkeurige beschrijving van de cliëntenpopulatie. Indien er sprake van een structuurindicator is, dan is noemer niet van toepassing.
Vraag	Wanneer er een vraag wordt gesteld over de organisatie van de zorg (vaak een klantpreferentievraag), dan kan de

	vraag aan de instelling hier geplaatst worden. De operationalisatie is dan hoe de indicator wordt gepubliceerd. Bijvoorbeeld: Vraag: "Op welke manier kunnen patiënten na de operatie contact opnemen bij vragen?" Operationalisatie: "Aangeboden manieren post-operatief contact"
Antwoordopties	Bij vragen is het belangrijk aan te geven of er slechts één antwoord mogelijk is of meerdere antwoorden mogelijk zijn. Daarnaast moeten de antwoordopties vermeld worden.
Definitie	Indien in de indicator termen worden gebruikt die enige toelichting nodig hebben, zodat betrouwbaar kan worden geregistreerd, dan wordt een definitie gegeven.
Aggregatieniveau	Het niveau waarop de indicatoren worden aangeleverd; in beginsel worden alle indicatoren op locatieniveau aangeleverd. In de uitgangspunten in de indicatorgids wordt voor de hele set aangegeven hoe hier mee om wordt gegaan. Per indicator kunnen specifieke aanwijzingen worden gegeven, bijvoorbeeld voor proces- en uitkomstindicatoren afkomstig uit kwaliteitsregistraties op concernniveau.
In- /exclusiecriteria populatie	Een duidelijke definiëring van de cliëntenpopulatie vertaalt zich uiteindelijk in duidelijke in- en exclusiecriteria. Daarnaast kunnen exclusiecriteria gebruikt worden om vergelijkbaarheid te vergroten. Bijvoorbeeld als bepaalde cliëntengroepen niet gelijk over instellingen zijn verdeeld.
Rekenregels en casemixcorrecties	Rekenregels voor het berekenen van de indicatorwaarde. Wanneer het relevant is voor een indicator kunnen cliëntkenmerken gebruikt worden voor het corrigeren van de indicatorwaarde. Hier moet worden aangegeven of er een casemixcorrectie plaatsvindt en op welke variabelen.
Databron (registratie)	De te gebruiken bron voor het berekenen van de indicatorwaarde. Bijvoorbeeld: LROI, NKR, DLCA-R, EPD, Zorgkaart Nederland
Norm	Als de indicator een norm kent, wordt deze hier in de indicatorgids vermeld. Ook de bron van de norm wordt vermeld.
Meetperiode	De meetperiode is de periode waarin de metingen worden gedaan. Dit is standaard het hele kalenderjaar (01-01 t/m 31-12), maar hier kan van worden afgeweken. Bij follow-upmetingen moet een expliciete keuze worden gemaakt: een meting drie maanden post-operatief binnen het verslagjaar betekent dat de operatie ook in de laatste drie maanden van het voorgaande jaar kan zijn uitgevoerd. Soms wordt er een peildatum gebruikt in plaats van een meetperiode (vaak bij structuurindicatoren). De peildatum ligt dan vaak op 01-03 van het jaar ná het verslagjaar.
Aanleverfrequentie	De frequentie waarmee de indicatoren aangeleverd worden. Afspraken over de frequentie worden landelijk gemaakt. Dit is momenteel één keer per jaar.

Eerste aanleverdatum	Geef aan op welke datum deze versie van de indicator bij het Zorginstituut moet worden aangeleverd. Deze datum wordt opgenomen op de Transparantiekalender.
---------------------------------	---